

# 初期巴金森氏病症狀


自我檢測記錄卡



病人姓名：

此紀錄卡主要是提供醫師了解您對藥效的反應及可能產生的副作用。請您或您的照護者在服藥後依症狀改善之程度或副作用產生之情形作適當的勾選。請在服藥後1~4周做評估。

△  
示意圖  
▽



## 劑量及服用的時間：

| Levodopa左旋多巴類藥品      |   | 第 1 週                         | 第 2 週                         | 第 3 週                         | 第 4 週                         |
|----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 美道普                  |  50/200 mg             | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 |
|                      |  HBS Cap.<br>25/100 mg | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 |
| 心寧美                  |  25/100 mg             | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 |
| Dopamine agonist 類藥品 |   |                               |                               |                               |                               |
| 力必平                  |  0.25 mg               | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 |
|                      |  PD Tab.<br>2 mg       | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 |
|                      |  PR Tab.<br>8 mg       | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 |
| 樂伯克                  |  0.25 mg               | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 |
|                      |  0.375 mg              | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 |
|                      |  PR Tab.<br>1.5 mg    | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 | ___ 顆，1日___次<br>__早__中__晚__睡前 |

其他類藥品

|       |  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 諾康亭   |  200 mg | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 |
| 巴可癒   |  5 mg   | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 |
| 麥斯克   |  100 mg | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 |
| 其他類藥品 |  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 百比停   |  2 mg   | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 |
| 顛立靜   |  5 mg   | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 |
| 阿丹    |  100 mg | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 |
|       |  | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 |
|       |  | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 |
|       |  | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 | ___顆，1日___次<br>___早___中___晚___睡前 |

此紀錄卡主要是提供醫師了解您對藥效的反應及可能產生的副作用。請您或您的照護者在服藥後依症狀改善之程度或副作用產生之情形作適當的勾選。請在服藥後1~4周做評估。

| 巴金森氏病<br>可能出現的症狀 |                | 未服藥前曾<br>出現的症狀 | 第 7 天 | 第 14 天 | 第 21 天 | 第 28 天 |
|------------------|----------------|----------------|-------|--------|--------|--------|
| 症<br>狀           | 顫抖             | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
|                  | 動作緩慢           | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
|                  | 走路碎步或拖行        | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
|                  | 駝背或側彎          | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
| 副<br>作<br>用      | 噁心             | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
|                  | 便秘             | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
|                  | 頭暈             | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
|                  | 心悸或低血壓         | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
|                  | 嗜睡             | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
|                  | 睡眠障礙           | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
|                  | 焦慮、行為<br>異常或妄想 | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
|                  | 其他：_____       | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |

此紀錄卡主要是提供醫師了解您對藥效的反應及可能產生的副作用。請您或您的照護者在服藥後依症狀改善之程度或副作用產生之情形作適當的勾選。請在服藥後1~4周做評估。

| 巴金森氏病<br>可能出現的症狀 |                | 未服藥前曾<br>出現的症狀 | 第 7 天 | 第 14 天 | 第 21 天 | 第 28 天 |
|------------------|----------------|----------------|-------|--------|--------|--------|
| 症<br>狀           | 顫抖             | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
|                  | 動作緩慢           | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
|                  | 走路碎步或拖行        | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
|                  | 駝背或側彎          | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
| 副<br>作<br>用      | 噁心             | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
|                  | 便秘             | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
|                  | 頭暈             | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
|                  | 心悸或低血壓         | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
|                  | 嗜睡             | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
|                  | 睡眠障礙           | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
|                  | 焦慮、行為<br>異常或妄想 | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |
|                  | 其他：_____       | 輕<br>中<br>重    |       |        |        |        |

初期巴金森氏病的治療是非常關鍵的，請耐心配合您的醫師對您的治療計畫。  
巴金森之友協會關心您的健康

